Účinná látka
aclonifen 600 g/l

Selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, slnečnici, hrachu, bôbe, fazuli, cibuli, mrkve, zeleri, petržlene, paštrnáku, koriandri, kôpri, rasci, fenikli a nechtíku lekárskom.

Balenie
HDPE kanister 5 l

Pôsobenie prípravku
Citlivé klíčiace a vzchádzajúce buriny prijímajú aclonifen pri prerastaní herbicídnym filmom vytvoreným na povrchu pôdy. Na zasiahnutých burinách sa objavujú chlorózy, sú zbrzdene v raste, nekrotizujú a následne odumierajú. Herbicídny film by nemal byť narušený obrábaním pôdy.

Spektrum účinnosti
Citlivé trávovité buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, stoklas jalový, psiarka poľná a prstovka krvavá. Ježatka kuria je stredne citlivá pri dávke 4 l/ha.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: bažanka ročná, rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný, hluchavky, horčica roľná, horčiaky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, láskavce, lobody, mrlík biely, mak vlčí, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, stavikrv vtáčí, veronika perzská, veronika roľná, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky, kolenec roľný, starček obyčajný, príhľava malá, mliečniky, lýrovka obyčajná, drchnička roľná, skorocele.
Menej citlivé buriny: lipkavec obyčajný na silno humóznych pôdach, pohánkovec ovíjavý, pakosty, rumany a konopnica v prípade oneskoreného vzchádzania.
Odolné buriny: pichliač roľný, pýr plazivý, pupenec roľný, proso, moháre, ovos hluchý, cirok alepský, ľuľok čierny, tetucha kozia, veronika brečtanolistá, viky a voškovník obyčajný.

Odporúčanie pre aplikáciu
Prípravok Bandur® aplikujte preemergentne v období pred vzídením burín alebo počas ich vzchádzania. Použitie je špecifické podľa plodiny. Predpokladom dobrej účinnosti je dostatočná pôdna vlhkosť a kvalitná príprava pôdy. Na piesočnatých pôdach s obsahom humusu pod 1 % nie je možné Bandur® aplikovať.

Návod na použitie

Plodiny	Buriny	Dávka na ha	Ochranná doba (dni)	Poznámka
zemiaky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	kŕmny
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	

Zemiaky
Prípravok sa aplikuje preemergentne v dávke 4 l/ha po slepej preorávke, najneskôr týždeň pred vzídením zemiakov. Po aplikácii nie je možné vykonávať ďalšie obrábanie pôdy.

Hrach, bôb a fazuľa
Prípravok aplikujete preemergentne po sejbe v dávke 4 l/ha, najneskôr týždeň pred vzídením týchto plodín.

Slnečnica
Prípravok aplikujete preemergentne po sejbe v dávke 4 l/ha, najneskôr týždeň pred vzídením slnečnice.

Cibuľa kuchynská
Prípravok aplikujte v rastovej fáze 2 - 4 listy cibule delenou aplikáciou 2 krát 0,5 l/ha. Interval medzi aplikáciami 10 - 14 dní. Bandur® nepoužívajte v jarnej (šalátovej) cibuli v červených odrodách cibule.

Mrkva
Jednorazová aplikácia: preemergentne, čím skôr po sejbe v dávke 3 l/ha.
Delená aplikácia: T1 pred vzídením plodiny v dávke 1,5 l/ha, T2 v rastovej fáze mrkvy 3 pravé listy v dávke 1 l/ha. Interval medzi T1 a T2 aplikáciou min 7 dní.

Zeler voňavý buľvový, zeler voňavý stopkový
Prípravok aplikujte po výsadbe v dávke 1 l/ha.

Kôpor voňavý, rasca, petržlen záhradný kučeravý, nechtík lekársky, koriander siaty, paštrnák siaty, fenikel obyčajný - čerstvé byliny, korenie, čaje
Prípravok aplikujte preemergentne, čím skôr po sejbe v dávke 3 l/ha na ľahkých a stredne ťažkých pôdach a v dávke 3,5 l/ha na ťažkých pôdach. V paštrnáku je maximálna dávka 3 l/ha.

Upozornenie pre použitie v mrkve, zeleri, paštrnáku, nechtíku lekárskom, koriandri, kôpri, rasci, petržlene, fenikli, fazuli, hrachu, lupine bielej a lupine úzkolistej.
Po aplikácii prípravku Bandur® boli pozorované poškodenia týchto kultúrnych rastlín. Intenzívne zrážky alebo príliš vysoký závlahový objem môžu splaviť účinnú látku aclonifen po sejbe do zóny klíčenia a spôsobiť poškodenie plodiny. Preto sa dbajte na to, aby výsevné lôžko bolo dobre pripravené s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou a bola dodržaná hĺbka sejby, aby osivo bolo rovnomerne pokryté pôdou.

Prípravok Bandur® aplikujte bezprostredne po sejbe, resp. pred vyklíčením plodiny. Neodporúčame aplikáciu na veľmi ľahkých pôdach s nízkym obsahom humusu a so sklonom k tvorbe pôdneho prísušku. **S porastmi prekrytými netkanými textíliami alebo fóliou nemáme dostatočné skúsenosti z testov a preto neodporúčame použitie prípravku Bandur® v rýchlených porastoch.**

Prípravok Bandur® nemiešajte s inými herbicídmi pri použití v týchto plodinách. Aplikácia prípravku Bandur® by sa pred použitím v rámci špecifických prevádzkových pestovateľských podmienok a na pestovaných druhoch a odrodách mala zásadne otestovať na malých plochách.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
V prípade likvidácie ošetrenej plodiny do 3 mesiacov po aplikácii je možné pestovať ako náhradnú plodinu **po orbe:** kukuricu, repu, fazuľu, ďatelinu, ľan, mätonoh trváci, **po bezorebnom spracovaní alebo plytkej kultivácii:** bôb, hrach, zemiaky, slnečnicu, rajčiak, šošovicu, kukuricu (pri max. aplikačnej dávke 3,5 l/ha Banduru).

V prípade likvidácie ošetrenej plodiny po 3 mesiacoch je možné pestovať ako následné všetky plodiny po predchádzajúcom spracovaní pôdy do hĺbky 10 - 15 cm.

Nedá sa vylúčiť poškodenie následne pestovaných dvojklíčnolistových medziplodín, pri repke olejnej a zeleninách nie je vylúčené poškodenie porastu.

Prípravok nesmie zasiahnuť úletom, výparom ani splavením okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené na osiatie!

Menej významné použitie

Návod na použitie

Plodiny	Buriny	Dávka na ha	Ochranná doba (dni)	Poznámky
cibuľa	mliečniky	T1: 0,5 l T2: 0,5 l	49	výsevy DA
mrkva	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná	3 l	90	
		T1: 1,5 l T2: 1,0 l	90	DA
zeler	dvojklíčnolistové buriny, psiarka poľná, lipnica ročná	1 l	90	buľvový, stopkový
paštrnák	dvojklíčnolistové buriny, psiarka poľná, lipnica ročná	3 l	90	
nechtík lekársky	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička	3 - 3,5 l	AT	
koriander	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 - 3,5 l	AT	
kôpor, rasca, fenikel	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 - 3,5 l	AT	čerstvé byliny/vňať, korenie, čaje
petržlen	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 - 3,5 l	AT	kučeravý čerstvé byliny/vňať
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	4 l	AT	
lupina biela, lupina úzkolistá	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	

Bandur®

Pestovateľ používa prípravok Bandur® v plodinách uvedených v tabuľke Menej významné použitie na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Odporúčaná dávka vody pri aplikácii prípravku Bandur® je 200 - 400 l vody na ha. Prípravok je možné aplikovať len jeden krát za vegetáciu, pri delenej aplikácii dva krát.