

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CUADRO NT®

CUADRO NT je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu (EC) určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stiebla obilní.

Účinná látka:

Trinexapac, 222 g/l t.j. vo forme Trinexapac-ethyl v obsahu 250 g/l
(21,9 % hm) (24,7% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: žiadne

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:



GHS07

Pozor

H317	Môže vyvolat' alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vázne podráždenie očí.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313	Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdných obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z..
SP1	Neznečistujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).
Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo2	Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Prípravok je pre populácie *Typhlodromus pyri* a *Aphidius rhopalosiphi* s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácia a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VELKOSPOTREBITELSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

FMC Agro Slovensko spol. s r.o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

21-01225-AU

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l coex HDPE/PA, f-HDPE flasa
5 l, 10 l coex HDPE/PA, f-HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka **trinexapac-ethyl** patrí do skupiny cyclohexandionov. Je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne hydrolyzovaný na aktívny derivát translokovaný do meristematických pletív. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej čo vedie k redukcii dĺžky internódii po aplikácii, čím sa zvyšuje odolnosť proti poliehananiu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,5 l	AT	
pšenica jarná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,5 – 0,6 l	AT	

jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	skrátenie steba, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,6 l	AT	
---	---	-------------	----	--

POKONY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Pšenica ozimná:

Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy, kedy je zástavnícový list celkom vyvinutý (BBCH 29 – 39).

Pšenica jarná:

Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy 2. kolienka (BBCH 29 – 32).

Jačmeň ozimný, raž, tritikale:

Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania steba do rastovej fázy, kedy je zástavnícový list celkom vyvinutý (BBCH 30 – 39).

Jačmeň jarný, ovos:

Prípravok aplikujte začiatku predlžovania steba do rastovej fázy, kedy je zástavnícový list už viditeľný, stále stočený (BBCH 30 – 37).

Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov.

Neaplikujte ak sa očakáva dážď alebo mráz.

Neaplikujte na mokré listy.

Prípravok neaplikujte na porast, ktorý je stresovaný prírodnými faktormi ako sucho, mráz, extrémne poškodenie škodlivými organizmami.

**INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI
A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH
ÚČINKOV NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

U niektorých odrôd sa môžu po aplikácii objaviť dočasné prejavy fytotoxicity (chlorózy, oslabenie rastu) alebo môže nastať posun vo vývoji odnoží. Uvedené prejavy však nemajú vplyv na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vzhľadom na mechanizmus pôsobenia prípravku sa nepredpokladá vývoj vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku CUADRO NT nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**Vplyv na následné a náhradné plodiny** – nepožadujú sa žiadne opatrenia.**Vplyv na susediace plodiny** – zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace rastliny.**VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Neočakáva sa žiadny negatívny účinok na užitočné alebo iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za

stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opäťovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Zabráňte kontaktu s očami! Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od pracujúcich a s postupom do neošetrenej plochy! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Pri práci s prípravkom je zakázané jest', piť a fajčiť. Po skončení práce sa dôkladne umyte vodou a mydlom. Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek na jedno použitie, tak pracovný/ochranný oblek a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

Ochrana operátora

Počas nakladania s prípravkom by mali byť používané rukavice a ochrana tváre.

Počas obsluhy pri aplikácii prípravku by mali byť používané rukavice.

Počas používania nejedzte, nepite a nefajčíte.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní

V prípade ťažkostí postihnutého premiestnite z miesta expozície. Ak ťažkosti pretrvávajú zabezpečte zdravotnú starostlivosť.

Po zasiahnutí
pokožky

Odstráňte znečistený odev a obuv a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa prejavia akékoľvek symptómy, vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí

Oči okamžite vypláchnujte prúdom čistej vody alebo očného roztoku a občasne odchýľte očné viečko do úplného vypláchnutia. Po niekoľkých minútach odstráňte kontaktné šošovky a znova vypláchnite. Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekára.

Po náhodnom požití

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa a vypite niekoľko pohárov vody alebo mlieka. Ak sa objaví zvracanie vypláchnite ústa a vypite znova tekutiny. Porad'te sa s lekárom.

Najdôležitejšie
symptómy a účinky
ako akútne tak aj
oneskorené

Podľa našich vedomostí neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky na ľudí. Kontakt s očami môže vyústiť do podráždenia.

V prípade požitia veľkého množstva prípravku je nevyhnutná okamžitá lekárska starostlivosť.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislave, tel: +421/2/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte s súlade s miestnymi nariadeniami.

Skladujte v uzavorených označených nádobách pri teplotách 0-30 °C. Sklad by mal byť

skonštruovaný z nehorľavých materiálov, uzatvorený, suchý, odvetraný a s nepriepustnou podlahou, bez prístupu nepovolaných osôb alebo detí. Miestnosť by mala byť používaná len pre skladovanie chemických látok. Potraviny, tekutiny, krmivo a osivo musia byť skladované oddelene. Malo by byť dostupné samostatné miesto na umytie rúk.

Chráňte pred nadmernou horúčavou alebo chladom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.